

DR. TAJA JORDAN

Pri odraslih bolnikih s kronično odpovedjo prebavil je potrebno trajno zdravljenje s parenteralno prehrano (PP). Zamaščenost jeter so opisovali kot pogost in resen zaplet PP. Vendar novejša spoznanja kažejo, da je zamaščenost jeter povezana s samo odpovedjo prebavil in se pojavlja pri 15–40 % odraslih bolnikov s kronično odpovedjo prebavil, kar nakazuje tudi neenotnost pri uporabi diagnostičnih kriterijev. Dr. Taja Jordan je v presečni preiskavi pri 63 bolnikih s kronično odpovedjo prebavil, ki so zdravljeni s PP na domu, z magnetno resonančno preiskavo natančno ocenila maščobno infiltracijo jeter. Z rezultati raziskave je prikazala, da imajo bolniki s kronično odpovedjo prebavil, ki imajo individualno načrtovano zdravljenje s PP, razmeroma majhno tveganje za zamaščenost jeter. Zamaščenost jeter je ugotovila pri 28,6 % bolnikov, le pri enem bolniku izrazito, pri treh bolnikih zmerno ter pri 14 bolnikih blago zamaščenost jeter. Trajanje zdravljenja s PP na domu pri bolnikih s kronično odpovedjo prebavil ni povezano z zamaščenostjo jeter, kar še dodatno potrjuje, da terapija s PP ni vzrok za zamaščenost jeter.

Dr. Taja Jordan je v okviru doktorskega študija objavila članek z naslovom »Liver steatosis in adult patients on home parenteral nutrition« v reviji *European journal of clinical nutrition*.